

O SKUPOVIMA

Do pojma skupa može se vrlo lako doći empirijskim putem , posmatrajući razne grupe, skupine, mnoštva neke vrste objekata , stvari, živih bića i dr. Tako imamo skup stanovnika nekog grada, skup knjiga u biblioteci, skup klupa u učionici itd.

Tvorac teorije skupova je **Georg Kantor** , nemački matematičar, koji je prvi dao “opisnu” definiciju skupa. Mnogi drugi matematičari su takođe pokušavali da definišu skup. **Danas, po savremenom shvatanju, pojam skupa se ne definiše, već se usvaja intuitivno kao celina nekih razičitih objekata.** Predmeti iz kojih je skup sastavljen zovu se **elementi** skupa. Postoje skupovi sa konačno mnogo elemenata, koje nazivamo **konačnim skupovima**, i skupovi sa beskonačno mnogo elemenata, odnosno **beskonačni skupovi**. Tako, na primer , skup stanovnika na zemlji predstavlja jedan konačan skup, dok skup svih celih brojeva sadrži beskonačno mnogo elemenata.

Skupove najčešće obeležavamo velikim slovima A,B ,.....X, Y,... , a elemente skupa malim slovima a,b,...,x,y,....

Ako je x element skupa X , tu činjenicu ćemo označavati sa $x \in X$, a ako ne pripada skupu X , označićemo sa $x \notin X$. Oznake ćemo čitati: “ x pripada skupu X ” ili “ x je element skupa X ”. Oznaku $x \notin X$ ćemo čitati “ x ne pripada skupu X ” ili “ x nije element skupa X ”

Postavimo sada pitanje: “ Koliko elemenata ima skup prirodnih brojeva većih od jedan a manjih od dva” ? Jasno je da takav skup nema ni jednog elementa. Za takav skup kažemo da je **prazan** i obeležava se sa \emptyset .

Međutim, desiće nam se nekad da nije zgodno, a ni moguće, da neposredno navedemo

sve elemente nekog skupa. Stoga se koristi i ovakvo zapisivanje skupova:

$\{x \mid S(x)\}$ ili, isto $\{x \mid x \text{ ima svojstvo } S\}$, što bi značilo "skup svih x koji imaju svojstvo S ". Na primer skup $X = \{7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ možemo zapisati i na sledeći način:
 $X = \{x \mid x \in \mathbb{N} \wedge 6 < x < 13\}$.

Za neka dva skupa kažemo da su **jednaki** ako su svi elementi jednog skupa ujedno

elementi drugog skupa, i obrnuto, svi elementi drugog skupa su elementi prvog

skupa. Zapisujemo: **$A = B$ ako i samo ako** ($\forall x)(x \in A \Leftrightarrow x \in B)$,

na primer po definiciji biće $\{a, a, a, b, b, c\} = \{a, b, b, c, c, c\} = \{a, b, c\}$.

Dakle, svaki član skupa je prisutan jednim pojavljivanjem, a sva ostala njegova pojavljivanja, ukoliko ih ima, nisu važna, i, uz to, ni redosled navođenja članova nije bitan.

Kažemo da je skup B **podskup** skupa A , što označavamo $B \subset A$, ako su svi elementi skupa B takođe i elementi skupa A , tj.

$B \subset A$ ako i samo ako ($\forall x)(x \in B \Rightarrow x \in A)$

Relacija uvedena ovom definicijom se zove relacija **inkluzije**. Ovde moramo voditi računa da se svi skupovi ne mogu upoređivati.

Prazan skup je podskup svakog skupa.

OPERACIJE SA SKUPOVIMA


- UNIJA
- PRESEK
- RAZLIKA
- SIMETRICNA RAZLIKA
- PARTITIVNI SKUP
- DEKARTOV PROIZVOD
- KOMPLEMENT SKUPA

UNIJA

Skup svih elemenata koji su elementi bar jednog od skupova A ili B , zove se unija skupova A i B i označava se sa $A \cup B$.

$$A \cup B = \{x | x \in A \vee x \in B\}$$

Na dijagramu bi to izgledalo ovako:




Primer: Ako je $A=\{1,2,3\}$ i $B=\{2,3,4\}$ $A \cup B=\{1,2,3,4\}$

PRESEK

Skup svih elemenata koji su elementi skupa A i skupa B zove se presek skupova A i B i obeležava se sa $A \cap B$.

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

Graficki prikaz bi bio:



Primer: Ako je $A=\{1,2,3\}$ i $B=\{2,3,4\}$ $A \cap B=\{2,3\}$



RAZLIKA

Skup svih elemenata koji su elementi skupa A ali nisu elementi skupa B zove se razlika redom skupova A i B u oznaci $A \setminus B$.

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

Naravno mozemo posmatrati i skup $B \setminus A$, to bi bili svi elementi skupa B koji nisu u A.


Na dijagramima to bi izgledalo ovako:



SIMETRIČNA RAZLIKA

Skup $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ naziva se simetrična razlika i najčešće se obeležava sa Δ .

$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$. Na dijagramu je:



Za naš primer je $A \Delta B = \{1,4\}$

PARTITIVNI SKUP

Skup svih podskupova skupa A naziva se **partitivni skup** skupa A i obeležava se sa $P(A)$.

Primer:


Ako je $A=\{1,2,3\}$, onda je $P(A)=\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\}$

KOMPLEMENT SKUPA

Unija, presek i razlika su binarne skupovne operacije, dok je komplement skupa unarna operacija. To je skup svih elemenata koji nisu sadržani u posmatranom skupu.

Komplement najčešće obeležavamo sa \bar{A}

Na slici bi bilo:



Primer: Ako je $A=\{1,3,7\}$ i $B=\{1,2,3,4,5,6,7\}$ onda je :

$$\bar{A} = \{2,4,5,6\}$$

DEKARTOV PROIZVOD

Čuveni francuski filozof i matematičar Dekart je u matematiku uveo pojam pravouglog koordinatnog sistema, koji se i danas, u njegovu čast, naziva Dekartovim koordinatnim sistemom. U tom sistemu svakoj tački ravni odgovara jedan uređeni par realnih brojeva (x,y) i, obrnuto, svakom paru brojeva (x,y) odgovara tačno jedna tačka u koordinatnoj ravni. Prvi broj x u tom paru nazivamo prvom koordinatom (apscisom), a drugi y , drugom koordinatom (ordinatom). Za uređene parove je karakteristična osobina:

$$(x,y) = (a,b) \text{ ako i samo ako } x=a \wedge y=b$$

Dekartov proizvod skupova je skup:


$$A \times B = \{(a,b) \mid a \in A, b \in B\}.$$

Treba voditi računa da $A \times B \neq B \times A$

Primer:

Ako je $M=\{1,2,3\}$ i $N=\{A,B\}$ onda je:

$M \times N = \{(1,A), (1,B), (2,A), (2,B), (3,A), (3,B)\}$. Na slici:



ZADACI

1. Dokazati da je prazan skup podskup svakog skupa.

Dokaz:

Mi ustvari trebamo dokazati da vazi: $\emptyset \subset A \Leftrightarrow (\forall x)(x \in \emptyset \Rightarrow x \in A)$

Kako prazan skup nema elemenata, to je istinitosna vrednost $x \in \emptyset$ sigurno netacna.

Dakle $\perp \Rightarrow x \in A$, podsetimo se tablice za implikaciju:

p	q	$p \Rightarrow q$
T	T	T
T	\perp	\perp
\perp	T	T
\perp	\perp	T

Implikacija je netačna jedino u slučaju kada je iskaz p tačan i iskaz q netačan.

Iz laži sledi sve, odnosno iz netačnog sledi sve(uvek tačno)

Dakle, prazan skup je podskup svakog skupa.

2. Dati su skupovi: $A = \{x \mid x \text{ se sadrzi u } 12, x \text{ pripada } N\}$, $B = \{x \mid x \text{ se sadrzi u } 20, x \text{ pripada } N\}$ i skup $C = \{x \mid x \text{ se sadrzi u } 32, x \text{ pripada } N\}$.

Odrediti: $A \setminus (B \cup C)$, $A \cup (B \cap C)$, i $A \setminus (B \setminus C)$

Resenje:

Najpre moramo odrediti skupove A,B, i C. Kada se x sadrzi u nekom broju to drugim recima znači da se taj broj može podeliti sa x.

Kako se broj 12 može podeliti sa 1,2,3,4,6,12 to je :

$A = \{1,2,3,4,6,12\}$, slično je $B = \{1,2,4,5,10,20\}$ i $C = \{1,2,4,8,16,32\}$

Odredimo $A \setminus (B \cup C)$. Najpre je $B \cup C = \{1,2,4,5,8,10,16,20,32\}$. Sada trazimo one koji su elementi skupa A a ne pripadaju $B \cup C$. To su 3,6,12, pa je $A \setminus (B \cup C) = \{3,6,12\}$

Odredimo $A \cup (B \cap C)$. Najpre naravno $B \cap C$, to su elementi koji su zajednicki za ova dva skupa, dakle: $B \cap C = \{1,2,4\}$. Dalje trazimo uniju skupa A i ovog skupa, to jest sve elemente iz oba skupa: $A \cup (B \cap C) = \{1,2,3,4,6,12\}$.

$$\begin{aligned} A \setminus (B \setminus C) &= \{1,2,3,4,6,12\} \setminus (\{1,2,4,5,10,20\} \setminus \{1,2,4,8,16,32\}) \\ &= \{1,2,3,4,6,12\} \setminus \{5,10,20\} \\ &= \{1,2,3,4,6,12\} = A \end{aligned}$$

3. Dati su skupovi $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ i $B = \{4, 5, 6, 7\}$. Odrediti skup X tako da bude:
 $X \setminus B = \emptyset$ i $A \setminus X = \{1, 2, 3\}$

Resenje:

Izgleda da cemo ovde imati vise mogucnosti za trazeni skup X .

Kako je $X \setminus B = \emptyset$, to nam govori da su svi elementi skupa B potencijalni elementi skupa X jer nema takvih elemenata da su u X a nisu u skupu B .

$A \setminus X = \{1, 2, 3\}$ nam govori da u skupu X sigurno nisu elementi $\{1, 2, 3\}$. Dakle:
 $X = \{4, 5\}$ ili $X = \{4, 5, 6\}$ ili $X = \{4, 5, 7\}$ ili $X = \{4, 5, 6, 7\}$

4. Na jednom kursu stranih jezika svaki slušalac uči bar jedan od tri strana jezika(engleski, francuski i nemački) i to : 18 slušalaca uči francuski, 22 uči engleski, 15 slušalaca uči nemački, 6 slušalaca uči engleski i francuski, 11 slušalaca engleski i nemački, 1 slušalac uči sva tri jezika.Koliko ima slušalaca na tom kursu i koliko od njih uči samo dva jezika?


Resenje: Najpre zapisimo pregledno podatke:

- 18 slušalaca uči francuski
- 22 uči engleski
- 15 slušalaca uči nemački
- 6 slušalaca uči engleski i francuski
- 11 slušalaca engleski i nemački
- 1 slušalac uči sva tri jezika

Najbolje je upotrebiti Venov dijagram sa tri skupa(njega popunjavamo tako što popunimo presek sva tri skupa, pa preseke po dva skupa, i na kraju, elemente koji pripadaju samo po jednom skupu)

ENGLEZI

FRANCUZI



NEMCI

Prvo upisemo 1 u preseku sva tri skupa. Zatim presek Francuzi i Englezi, ali tu ne pisemo 6, vec $6-1=5$, onda presek Englezi i Nemci $11-1=10$.

Dalje je ostalo $18-5-1=12$ koji uce samo francuski, $22-10-5-1=6$ koji uce engleski i na kraju $15-10-1=4$ koji uce nemacki.

Broj slusaoca je $12+5+6+1+10+4=38$, a broj onih koji uce samo dva jezika je $10+5=15$

5. Dokazati skupovnu jednakost:

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

Ovde uvek krećemo isto ($\forall x$) x pripada levoj strani, = zamenimo sa \Leftrightarrow , pa x pripada desnoj strani. Koristimo definicije skupovnih operacija dok potpuno ne rastavimo obe strane. Dalje preko logickih operacija dokazemo da je nastala formula tautologija.

Pazi: = menjamo sa \Leftrightarrow , \cup menjamo sa \vee , \cap menjamo sa \wedge , itd.

Dokaz:

$$\begin{aligned} (\forall x)(x \in (A \cup B) \cap C) &\Leftrightarrow (x \in (A \cap C) \cup (B \cap C)) \\ (x \in (A \cup B) \wedge x \in C) &\Leftrightarrow (x \in (A \cap C) \vee x \in (B \cap C)) \\ ((x \in A \vee x \in B) \wedge x \in C) &\Leftrightarrow ((x \in A \wedge x \in C) \vee (x \in B \wedge x \in C)) \end{aligned}$$

neka je: $p = x \in A$

$q = x \in B$

$r = x \in C$

Dobili smo formulu: $F: ((p \vee q) \wedge r) \Leftrightarrow ((p \wedge r) \vee (q \wedge r))$

Nju sad moramo dokazati preko tablice i upotrebom logickih operacija:

p	q	r	$p \vee q$	$(p \vee q) \wedge r$	$p \wedge r$	$q \wedge r$	$(p \wedge r) \vee (q \wedge r)$	F
T	T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	\perp	T	\perp	\perp	\perp	\perp	T
T	\perp	T	T	T	T	\perp	T	T
T	\perp	\perp	T	\perp	\perp	\perp	\perp	T
\perp	T	T	T	T	\perp	T	T	T
\perp	T	\perp	T	\perp	\perp	\perp	\perp	T
\perp	\perp	T	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	T
\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	T

Formula JESTE TAUTOLOGIJA, pa je time dokaz završen.



6. Dokazati skupovnu jednakost:

$$C \setminus (A \cap B) = (C \setminus A) \cup (C \setminus B)$$

Dokaz: $(\forall x)(x \in C \setminus (A \cap B)) \Leftrightarrow (x \in (C \setminus A) \cup (C \setminus B))$

$$(x \in C \wedge x \notin (A \cap B)) \Leftrightarrow (x \in (C \setminus A) \vee x \in (C \setminus B))$$

$$(x \in C \wedge \neg(x \in A \wedge x \in B)) \Leftrightarrow (x \in C \wedge \neg(x \in A)) \vee (x \in C \wedge \neg(x \in B))$$

neka je: $p = x \in A$


$q = x \in B$

$r = x \in C$

$$F: (r \wedge \neg(p \wedge q)) \Leftrightarrow ((r \wedge \neg p) \vee (r \wedge \neg q))$$

Ovo dokazujemo tablicno:

p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$r \wedge \neg(p \wedge q)$	$r \wedge \neg p$	$r \wedge \neg q$	$(r \wedge \neg p) \vee (r \wedge \neg q)$	F
T	T	T	\perp	\perp	T	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	T
T	T	\perp	\perp	\perp	T	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	T
T	\perp	T	\perp	T	\perp	T	T	\perp	T	T	T
T	\perp	\perp	\perp	T	\perp	T	\perp	\perp	\perp	\perp	T
\perp	T	T	T	\perp	\perp	T	T	\perp	T	T	T
\perp	T	\perp	T	\perp	\perp	T	\perp	\perp	\perp	\perp	T
\perp	\perp	T	T	\perp	T	T	T	T	T	T	T
\perp	\perp	\perp	T	T	\perp	T	\perp	\perp	\perp	\perp	T



Dakle ova formula jeste TAUTOLOGIJA, pa je pocetna skupovna jednakost **tačna**.